



U onderging vandaag **prostaatpuncties**, waarbij via een naaldprik weefsel uit de prostaat werd genomen voor microscopisch onderzoek. Als gevolg van het onderzoek kunnen nadien mogelijks bepaalde symptomen aanwezig zijn, waarbij wij U enkele raadgevingen geven :

- * Bloedverlies via urine: klaart steeds spontaan op, waarbij aangeraden wordt veel te drinken.
- * Bloedverlies via stoelgang: klaart steeds spontaan op, er moet vermeden worden om mee te persen tijdens de stoelgang.
- * Bloedverlies bij zaadlozing: dit uit zich meestal als een donkere zaadlozing de eerste keer na de puncties, dit gaat ook spontaan over.
- * Urineweginfectie: ter voorkoming van een urineweginfectie (met koorts) krijgt U steeds antibiotica toegediend bij de puncties. Mochten er na een paar dagen toch duidelijke klachten blijven met pijnlijke en branderige plasbeurten moet zeker de huisarts of behandelende uroloog gecontacteerd worden die steeds eerst een urineonderzoek moet instellen en eventuele therapie moet opstarten.
- * Koorts: wijst meestal op een ernstige infectie waarbij onmiddellijke therapie moet opgestart worden. Bij blijvende koorts ondanks ingestelde behandeling of temperatuur > 38,5 ° C meldt men zich best via de spoedgevallendienst in het ziekenhuis aan voor verder onderzoek of behandeling.
- * Pijn of ongemakken : komt slechts bij een minderheid van de patiënten voor en gaat normaal spontaan en vrij snel over. Zelden is pijnmedicatie nodig waarbij een bruistablet (vb Perdolan® of Dafalgan®) meestal volstaat.