



Er werd bij U een plastic buisje (**uretersplint**) geplaatst in de urineleider tussen de nier en de blaas (ureter). In het geval van een uretersteen (steen die vrijgekomen is uit de nier en die zorgt voor een blokkage van de urineafloop) wordt er dank zij dit buisje voor gezorgd dat de urine opnieuw kan aflopen en de pijn verdwijnt. Anderzijds zorgt dit buisje voor een uitzetting van de urineleider waardoor het steentje verder kan indalen en hopelijk uitgeplast kan worden. Ook wanneer men er in slaagde de steen met de camera eruit te halen, wordt soms nog een buisje nagelaten om te verhinderen dat er door de zwelling nog een tijdelijke blokkage blijft bestaan.

Over het algemeen wordt het buisje er na een 2-tal weken uitgehaald.

Er zijn een aantal kenmerken eigen aan een uretersplint die als “normaal” moeten beschouwd worden en U niet mogen verontrusten:

- Het uiteinde in de blaas kan blaasprikkeling veroorzaken met neiging tot frequenter plassen, eveneens kan door wrijving tegen het blaasslijmvlies bloedverlies tijdens het plassen optreden.  
Voor beide ongemakken is het aangeraden veel te drinken.
- Tijdens het plassen kan er urine terugstromen naar de nier wat als een lichte stuwing of druk in de flank kan gevoeld worden, doch slechts zelden wordt dit als echt pijnlijk ervaren.